


Biossegurança avícola

Guia para prevenir a entrada de agentes patogênicos


PBI PREMISES
BIOSECURITY
INDEX

1 Galpões




- Mantenha os telhados e superfícies em bom estado de conservação
- Instalar redes para impedir a entrada de aves silvestres
- Cerca de perímetro de controle
- Separar as áreas "sujas" das "limpas"
- Exiba sinalização clara^{1,2}

2 Premises



- Mantenha os locais livres de musgo
- Manter os quintais limpos e sem poças de água
- Mantenha todas as portas e portões trancados
- Realizar o controle de roedores e pragas^{1,2}

3 Bedding



- Mantenha a cama longe de aves silvestres
- Desinfete a embalagem externa antes de abrir
- Desembale antes de levar para o galpão
- Limpe e desinfete as superfícies ao redor^{1,2}

4 Equipamentos




- Evite compartilhar entre locais e galpões
- Garantir uma limpeza e desinfecção completas
- Guarde sempre em ambientes fechados^{1,2}

5 Equipe




- Utilize botas, roupas e EPI adequados ao local de trabalho
- Evite visitar vários locais no mesmo dia
- Participar regularmente de treinamentos sobre biossegurança
- Mantenha os protocolos atualizados^{1,2}

6 Visitantes




- Reduzir ao mínimo o número de visitantes nos galinheiros
- Manter registros precisos e bem organizados
- Informar os visitantes sobre os requisitos de biossegurança
- Supervisionar os visitantes para que as orientações da sinalização sejam respeitadas^{1,2}

7 Veículos




- Manter registros dos veículos que entram no local
- Colocar sinalização sobre os requisitos de desinfecção
- Instalar postos de higienização em todas as entradas^{1,2}

8 Geral



- Mantenha as instalações bem ventiladas
- Utilize desinfetantes aprovados na diluição correta
- Coloque bacias com desinfetante para os pés em todas as entradas
- Reduzir ao mínimo o número de veículos e pessoas no local, limitando-se apenas ao essencial^{1,2}

9 Transição entre lotes




Descarte: Esterco, cama, aves mortas e resíduos fora do galpão

Lavagem a seco: Remova poeira, penas e matéria orgânica

Lavagem: Use detergente e água quente (com lavagem sob pressão, se possível)

Desinfecção: todas as superfícies, incluindo paredes, pisos e tetos

Tempo de inatividade: Deixe o galpão vazio e seco por pelo menos 7 a 14 dias^{1,2}



EMPOWERING
IMMUNE RESILIENCE



Para obter mais informações sobre o nosso Índice de Biossegurança das Instalações, entre em contato com o seu representante da Kemin ou escreva para: Kemin.BioLogics@kemin.com

© Kemin Industries, Inc. e seu grupo de empresas, 2026. Todos os direitos reservados. [®] Marca registrada da Kemin Industries, Inc., EUA. Determinadas declarações, rotulagens de produtos e alegações podem variar conforme a região ou conforme exigido por regulamentações governamentais locais. Referências: 1. Delpont et al (2023). Monitoring biosecurity in poultry production: an overview of databases reporting biosecurity compliance from seven European countries. 2. National Farmers Union (2025). Poultry Biosecurity Protocols against Notifiable Diseases. PTP-14809

KEMIN
Compelled by Curiosity™